

★ガイドライン 2020 対応 小児・乳児の一次救命★

① 反応を確認する

反応なし

あなたは119番通報をして救急車を呼んでください！
あなたはAEDを持ってきてください！

肩をたたいて
呼びかける！

② 助けを呼ぶ

(119番通報とAEDの手配)

※119番通報者は通信指令課員の指示に従う



胸・腹部の
上がい下がい
を見て確認！

③ 呼吸の確認(10秒以内)

している

横向きで気道を確認し、応援・救急隊を待つ。

傷病者と救助者の顔が
近づきすぎないように！

普段どおりの呼吸をしているか？

していない、またはわからない

<ウイルスの飛散を防ぐため>

胸骨圧迫を開始する前に

ハンカチやタオルなどを傷病者の鼻と口にかぶせるようにする

④ ただちに心肺蘇生(胸骨圧迫)を始める

・胸骨圧迫

★強く(胸の厚さの約1/3が沈む強さで)

★速く(1分間に100~120回のテンポで)

★絶え間なく(中断は最小に)



⑤ 胸骨圧迫を続ける

⑥ AED到着

電源を入れる。電極パッドを素肌に貼る。

《注意》

・胸が濡れていたら拭く

・貼り薬があればはがす

・ペースメーカーを避けて

パッドを貼る

⑦ 心電図の解析
電気ショックは必要か？

必要あり

必要なし

⑧ 電気ショック1回

⑨ ただちに心肺蘇生を再開

(2分後AEDが自動的に解析を行う)

⑧ ただちに心肺蘇生を再開

(2分後AEDが自動的に解析を行う)

※救急隊に引き継ぐまでか、傷病者に普段どおりの呼吸や目的のある仕草がみられるまで心肺蘇生を続ける