

保護者同伴で接種してください。やむを得ない理由により保護者（父、母、後見人）が同伴できない場合は、接種を受けるお子様の健康状態を普段からよく知っており、予診票の内容をよく理解している親族（祖父母等）などが同伴し、予防接種を受けることも可能です。その場合、保護者の委任状が必要となります。保護者以外の方が同伴する場合は、事前に保護者が下記の委任欄に記入（代理人氏名は代理人が自署）し、医療機関の受付に提出してください。代理人は18歳以上（大学生相当）の成人とします。

委任状

年 月 日

保護者(委任者) 住所 松江市 _____ 氏名（保護者自署） _____ 緊急時の連絡先（電話番号） _____ _____ 右記の者にこの予防接種に関する一切の権限と責任を委任します。	代理人(同伴者) 住所 松江市 _____ 氏名（代理人自署） _____ 予防接種を受けるこどもの続柄 _____ 連絡先（電話番号） _____ _____
--	--

腸重積症の説明

接種後1～2週間は「腸重積症」に注意が必要です。腸重積症とは、腸が腸に入り込み、閉塞状態になる病気です（下図）。ワクチンの接種にかかわらず、生後3か月～2歳くらいまでの赤ちゃんがかかりやすい病気です。できるだけ腸重積症の起こりにくい早めの時期に接種し、早めの時期に完了させましょう。初回接種を出生15週0日後以降に受けることはお勧めしていません。




- 10～30分おきに火が付いたように激しく泣く
- といった繰り返す不機嫌
- 便に血が混じる（いちごゼリー状）
- 嘔吐を繰り返す ■ ぐったりする
- 顔色が悪い

ロタウイルス感染症予防接種 1回目

対象年齢	ロタリックス(1価): 出生6週0日後から出生24週0日後まで ロタテック(5価): 出生6週0日後から出生32週0日後まで
実施方法	個別接種(医療機関一覧表をご覧ください)


<ロタリックス(1価)>



【標準: 1回目接種の開始は生後2か月～出生14週6日後まで】

※接種が遅くなることにより、2回目の接種ができなくなりますので、ご注意ください。

<ロタテック(5価)>



【標準: 1回目接種の開始は生後2か月～出生14週6日後まで】

※接種が遅くなることにより、2回目・3回目の接種ができなくなりますので、ご注意ください。

・保護者同伴で接種してください。